

TEELTHANDLEIDING: Trechter oesterzwam deuvelbroed voor 2 stam

- zakje van 50 deuvels
- boomstam: dm > 11cm, lengte ca. 40 cm
- schors > 90% onbeschadigd
- gezonde berk, hazelaar, iep, populier, wilg
- enten: hele jaar rond
- paddenstoelstam rechtop in een schaduwrijke plek in de tuin
- oogst: lente – herfst
- smaak: licht amandelachtig

- bruikbaar tot 2 maanden na aankoop
- in koelkast bewaren

Pleurotus cornucopiae

Boom moet gezond zijn want zieke bomen zijn al “bezet” met een andere schimmel.

Boomsorten: goed – iep, populier met dm > 11 cm; beuk, wilg met dm > 15 cm.
redelijk – berk, hazelaar met dm > 11 cm.

Boomstam: diameter – hoe dikker hoe beter, lengte ca. 40 cm

Schors: > 90% onbeschadigd

Entperiode: hele jaar, liefst feb-half april.

* Materiaal: boomstam van een gezonde boom, boormachine, hss of entboortje met dm 8,5 mm; hamer.

* Entfase: ent tussen 3 weken en 3 maanden na de kap, hoe eerder hoe beter. Gaten boren: rondom beide uiteinden op stam 5 cm uit elkaar; verspreid over stam in onregelmatig zigzag patroon 8-10 cm uit elkaar; gat iets dieper dan lengte van deuvvel. Deuvvel helemaal erin tikken. Na enten 2 weken vorstvrij houden.

* Doorgroefase: minstens 1 zomerperiode. Schaduwrijke plaats, liefst onder struik of bosrijke omgeving uit de tocht en uit de volle zon. Rechtop met een kant 1-2 cm in de grond. Sproeien tijdens lange, warme of droge periodes.

* Oogstfase: lente & nazomer, afhankelijk van het weer 2-3 x/jaar. Pluk als de hoed naar beneden is gekruld en trechtervorm zichtbaar is. Smaak: romig amandelachtig. Bakken: paar minuten in hete olie of boter op een hoge vuur. Overwinteren buiten.